



**SINDROME DE FIBROMIALGIA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA POBLACION ESPAÑOLA Y DESATURACIONES NOCTURNAS COMO FACTOR ETIOPATOGENICO.**

SE ESTUDIAN LOS SINTOMAS CLINICOS ASOCIADOS A LA FIBROMIALGIA (FM) EN LA POBLACION ESPAÑOLA.

**Año Académico:** 1994

**Universidad:** VALLADOLID

**Centro de Lectura:** MEDICINA

**Centro Realización:** DEPARTAMENTO: DE MEDICINA PROGRAMA DE DOCTORADO: CURSOS MONOGRAFICOS

**Director:** MARAÑÓN CABELLO ANGEL

**Tribunal:** CASTRO DEL POZO SISINIO DE, HERREROS FERNANDEZ VICENTE , GONZALEZ VILLARON LUIS, LOPEZ DE JUAN MARIANO, CORPORALES LOPEZ LUIS

**Descriptores:** CIENCIAS MEDICAS; MEDICINA INTERNA; REUMATOLOGIA;

**Resumen:**

SE ESTUDIAN LOS SINTOMAS CLINICOS ASOCIADOS A LA FIBROMIALGIA (FM) EN LA POBLACION ESPAÑOLA. CUANDO SE COMPARAN CON UN GRUPO CONTROL NO SE OBSERVAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA PREVALENCIA DE S. DE INTESTINO IRRITABLE, FENOMENO DE RAYNAUD Y S.



SECO. LA PREVALENCIA AUMENTADA DE ANSIEDAD SOLO SE OBSERVO EN LA FM PRIMARIA, NO EN LA FM CONCOMITANTE, NI EN LOS CONTROLES. EN CONJUNTO, LAS CARACTERISTICAS CLINICAS DE LAS PACIENTES ESPAÑOLAS CON FM SON SEMEJANTES A LAS DESCRITAS EN OTROS PAISES, DESTACANDOSE NUESTRAS PACIENTES POR UNA MENOR PREVALENCIA DE S DE INTESTINO IRRITABLE Y UNA MAYOR PRESENCIA DE PARESTESIAS.

SE ESTUDIA ADEMAS, LA PRESENCIA DE CAIDAS NOCTURNAS EN LA SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO DE LA HEMOGLOBINA COMO ORIGEN DE LA HIPOXIA MUSCULAR DESCRITA EN ESTOS PACIENTES. HEMOS OBSERVADO MAYOR NUMERO DE DESATURACIONES NOCTURNAS EN LAS PACIENTES CON FM QUE EN EL GRUPO CONTROL Y MAYOR PERMANENCIA A LO LARGO DE LA NOCHE EN SATURACIONES INFERIORES AL 92 Y 90%. ESTAS DESATURACIONES NO SE DEBEN, EN GENERAL, A LA PRESENCIA DE UN SINDROME DE APNEA DEL SUEÑO ASOCIADO. ESTAS ALTERACIONES PUEDEN TENER IMPORTANCIA EN LA ETIOPATOGENIA DE LA FM.